



Mosquit Tigre

La prevenció és el millor mètode per al control d'aquest mosquit

Els mosquits ponen els ous en recipients que acumulen aigua; seguidament es desenvolupen les larves i en menys de set dies neixen els mosquits. Els mosquits adults poden actuar com a transmissors d'algunes malalties, com les produïdes pel virus del dengue, del chikungunya i del zika.

El més efectiu és evitar la posta d'ous eliminant els punts d'acumulació d'aigua. Per això, és imprescindible la col·laboració ciutadana, ja que la majoria de focus de mosquits es troba a les propietats privades, especialment en les que hi ha badius (badius), terrasses o jardins.

L'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar-ne la plaga.



Com podem evitar els punts d'acumulació d'aigua a casa



- Buidant dos cops per setmana o posant cap per avall els recipients de l'exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, plats d'animals domèstics, piscines de plàstic, etc.
- Buidant dos cops per setmana els safareigs, les basses i els dipòsits d'aigua o bé tapant-ho amb tela mosquitera espessa.
- Evitant acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.
- Evitant els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua i tapant els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra.

En cas que cap d'aquestes opcions sigui possible, caldrà fer un tractament amb els productes larvicides existents al mercat.



Ajuntament de Badalona

badalona.cat



Mosquit Tigre

La prevenció és el millor mètode per al control d'aquest mosquit

Com podem evitar les picades

- És recomanable portar roba de màniga llarga i pantalons llargs (millor si són de colors clars), així com mitjons.
- Instal·lant teles mosquiteres als edificis.
- De manera complementària, utilitzant repel·lents cutanis, seguint les instruccions d'ús del fabricant.
- Extremant les precaucions si viatgem a zones on els mosquits poden transmetre malalties.

Com hem de curar les picades

- Hem de rentar i desinfectar bé la zona de la picada.
- El tractament és simptomàtic, però en cas que persisteixin les molèsties, cal consultar el metge.



PER A MÉS INFORMACIÓ

Unitat de Protecció de la Salut | Tel. 93 483 27 78 | protecciosalut@badalona.cat